

## İLAÇLARIN KULLANIM SÜRESİ, DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE SAKLANMA KOŞULLARI LİSTESİ

Kodu  
İ.Y.LS.33

Yayın tarihi  
20.10.2023

Revizyon No  
0

Revizyon tarihi  
-

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
1 / 7

İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
ADENOZİN 50 MG 10 ML FLAKON	Açıldıktan ve sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Yüksek riskli ilaç	25 °C'nin altında oda sıcaklığında saklanır.
ADEPİRON AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Başka ilaçlarla karıştırılmaz 1 yaşından küçük IM yapılır 1 yaşından büyük IM/IV yapabilir. 3 aylıktan küçük Olanlara yapılmamalıdır.	25 °C'nin altında oda sıcaklığında saklanır.
ADRENALİN 0,5 AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Subkutan enjekte edilir Acil durumlarda IV yapılır. Yüksek riskli ilaç	25 °C'nin altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalı.
AKINETON AMPUL	Açıldıktan sonra kalan miktar atılmalıdır.	IM veya IV uygulanır.	25 °C'nin altında oda sıcaklığında saklanır.
ALCAİNE DAMLA	Açıldıktan sonra buzdolabında en fazla 1 ay saklanabilir.	Sadece topikal kullanılır enjekte edilmemeli veya içilmemelidir.	2-8°C arasında buzdolabında saklanır, ışıktan korunmalıdır.
ALLENİK AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	IV veya IM yapılır 2 yaş altı çocuklarda kullanılmaz.	25 °C'nin altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır
ALPROSTADİL 500 MG FLAKON	Açıldıktan sonra buzdolabında 24 saat saklanabilir.	% 0,9 izotonik %5 glikozla seyreltilerek kullanılır.	2-8°C muhafaza edilir. Işıktan korunmalıdır.
ALTUZAN FLAKON	Açıldıktan sonra kalan miktar atılmalıdır.	%0,9 izotonikle seyreltilir. IM olarak uygulanır. Flk içeriği beraberindeki enjeksiyonluk su ile sulandırılır.	2-8°C buzdolabında saklanır. Işıktan koruyunuz .
AMBİSOME AMPUL	Açıldıktan sonra kalan kısmı saklanmaz, atılmalıdır.	30-60 dk IV olarak verilmelidir. Enjeksiyonluk su ile hazırlanır %5 Dextroz ile seyreltililebilir.	25 °C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız
AMİDOVİN AMPUL	Açıldıktan sonra kalan kısmı atılmalıdır.	Yalnız hastanelerde IV olarak uygulanır. Yüksek riskli ilaçtır.	25 °C'nin altında oda sıcaklığında saklanır, ışıktan korunmalıdır.
APTAMİL MAMA	Açıldıktan sonra hemen tüketilmelidir.	Doğumdan itibaren oral beslenme olarak kullanılır.	15-25°C ortamda saklanır.
ASİST AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Çocuklarda IM injeksiyon ile uygulanır Erişkinlerde IM ve IV uygulanır.	25°C altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.
ATARAX ŞURUP	Son kullanım tarihine kadar kullanılır.	Oral kullanılır.	25°C altında oda sıcaklığında ışıktan ve nemden korunmalıdır.
ATROPİN 0,5 AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır	IM, IV veya subkutan kullanılır. Yüksek riskli ilaçtır.	25°C altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.
ATROVENT İNHALER	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Nebulizatör cihazı le inhalasyon şeklinde kulanılır.	25°C altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.
AVİJECT AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	IM veya IV uygulanır.	25°C altı oda sıcaklığında saklanır.
B.T ENEMA LAVMAN	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır .		25°C altında oda sıcaklığında saklanır.
BACTROBAN POMAD	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	10 gün süreyle haricen kullanılır.	25 °C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
BATIDEX SOLUSYON	Açıldıktan sonra sterilitesi bozulmadan kullanılabilir.	Sadece haricen kullanılır	25°C altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.
BEHEPTAL AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	İM veya IV şeklinde ışıktan korunarak uygulanmalıdır.	15-30°C arasında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır

## İLAÇLARIN KULLANIM SÜRESİ, DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE SAKLANMA KOŞULLARI LİSTESİ

Kodu  
İY.LS.33

Yayın tarihi  
20.10.2023

Revizyon No  
0

Revizyon tarihi  
-

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
2 / 7

İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
BENİSON AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Derin İM veya IV kullanılır.	15-30°C arasında oda donmaktan ve ışıktan koruyarak saklayınız.
CALCIUM AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Kristallenme olmuşsa amp. 30-40°C ısıtıp kullanılır. % 5'lik glikoz ya da % 0,9'luk sodyum klorür çözeltisiyle seyreltilmelidir. Bikarbonat, fosfat veya sülfat içeren seyreltme solüsyonlarının kullanımından kaçınılmalıdır. Yavaş infüzyon yapılmalıdır.	15-30°C arasında oda sıcaklığından dondurmadan saklayınız.
CALPOL SÜSPANSİYON	Son kullanım tarihine kadar kullanılır.	Kullanmadan çok iyi çalkalanmalıdır.	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.
CARENA AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	İV olarak kullanılır. Yavaş infüzyon yapılmalıdır.	25°C altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.
CARNİTİNE AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	2-3 dak. Yavaş enjeksiyonla veya infüzyon olarak verilir.	25 °C'nın altında oda sıcaklığında saklanır.
CHİROCAİNE AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Tek kullanımlıktır. Kullanılmayan kısımları atılmalıdır.	15-30°C arasında oda sıcaklığında saklanır.
CİPROFLOKSASİN FLAKON	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Cipro %0,9 NaCL, Ringer solüsyonu Ringer laktat solüsyonu %5 ve %10 glikoz solüsyonu %0,45 NaCL ile geçimlidir. Belirtilen infüzyon solüsyonları ile karıştırıldığında mikrobiyolojik açıdan ve ışık duyarlığı açısından hemen kullanılmalıdır.	25 °C oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Buzdolabında muhafaza etmeyiniz. Dondurmayınız.
CLEXANE 0,4 AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Tek kullanımlık şırıngadır. Subcutan Uygulanır.	25 °C'nın altında oda sıcaklığında dondurmadan saklayınız.
COLIMYCİN AMPUL	Rekonstitüsyon çözeltisi 2-8°C buzdolabında 7 gün saklanır.	Başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.	Normal oda sıcaklığında 25 °C'nın altında saklanır.
CORDARONE AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	IV yolla uygulanır. Yavaş infüzyon yapılmalıdır.	25°C altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.
CUROSURF FLAKON	Oda sıcaklığına kadar ısıtılmış olan açılmamış flakonlar daha sonra 1 kereye mahsus olarak 24 saat içinde tekrar buzdolabına konabilir oda sıcaklığına kadar ısıtılmış ambalajları bir kereden fazla koymayınız.	İlk uygulamadan sonra flakonda kalan kısmı kullanmayınız kullanılmayan kısımları ilerde kullanmak için saklamayınız. İntratrakeal uygulanır.	2-8°C arasında ışıktan koruyarak saklayınız.
DEKSAMET 8 MG AMPUL	Açıldıktan sonra kalan kısım kullanılmamalıdır.	İM ve IV olarak uygulanır.	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız. Donmaktan koruyunuz.
DEMİZOLAM 5 MG ve 15MG AMPUL	Açıldıktan sonra kalan kısım kullanılmamalıdır.	İM ve IV olarak uygulanır.	30°C altında oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.
DEPAKİN 200 MG ORAL ÇÖZELTİ		Ambalaj içindeki dozaj enjektörü kullanılarak uygulanır.	25°C altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız. Dondurmayınız.
DESFERAL FLAKON	Açılan ilacın tamamı kullanılmalıdır.	İM, SC ve IV olarak uygulanır.	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.

## İLAÇLARIN KULLANIM SÜRESİ, DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE SAKLANMA KOŞULLARI LİSTESİ

Kodu  
İY.LS.33

Yayın tarihi  
20.10.2023

Revizyon No  
0

Revizyon tarihi  
-

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
3 / 7

İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
DİAZEPAM DESİTİN REKTAL	Tek kullanımlıktır. Tüpte kalan miktar kullanılmaz.	Makattan uygulanır.	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.
DİGOXİN AMPUL	Üründe ve ambrajında bozukluk varsa kullanmayınız.	IV olarak uygulanır. Yavaş uygulanmalıdır.	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.
DOBCARD AMPUL	Hazırlanan çözelti 24 saat içinde kullanılmalıdır.	IV olarak uygulanır.	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Dondurmayınız.
DOPADREN AMPUL	Hazırlanan çözelti 24 saat içinde kullanılmalıdır.	Seyretilerek IV olarak uygulanır.	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.
DRAMAMİNE AMPUL	Tek kullanımlıktır.	IM olarak uygulanır. Uygun vakalarda IV olarak uygulanır.	25°C altında oda sıcaklığında nemden ve ışıktan koruyarak saklayınız.
EKİPİM FLAKON	Açılan flakonlar Oda sıcaklığında 24 saat,buzdolabında 7 gün süre ile saklanabilir.	IM veya IV olarak uygulanır.	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.
EMEDUR AMPUL	Açıldıktan sonra kalan kısım kullanılmaz.	IM olarak kullanılmalıdır.	Oda sıcaklığında nemden ve sıcaktan uzak muhafaza ediniz.
EPİTOİN AMPUL	Açıldıktan sonra 1 saat içinde uygulanmalıdır.	IV olarak kullanılır	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.ışıktan koruyunuz
EQİTAX FLAKON	Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.	IM veya IV olarak uygulanır.	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
ESELAN FLAKON	Çözüldükten sonra oda sıcaklığında 4 saat buzdolabında 12 saat saklanır .	IV olarak uygulanır.	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyuz.
ESMERON FLAKON	Flakon açıldıktan sonra en kısa zamanda kullanılır	IV olarak uygulanır.	Karanlıkta ve 2-8°C'de saklanır.
FENTANYL AMPUL	Açıldıktan sonra saklanmamalıdır.	İV olarak genel anesteziye kullanılır.	15-30°C arasında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.
FLİXOTİDE NEBUL	Açılmış nebul buzdolabında saklanmalı ve 12 saat içinde kullanılmalıdır.	Oral inhalasyon içindir.	30°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.Donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.
FUCİTHALMİC GÖZ DAMLASI	Kapağı açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.	Göze tatbik edilir.	Oda sıcaklığında nemden ve sıcaktan muhafaza ediniz.
FUROMİD AMPUL	Açıldıktan sonra kalan miktar atılmalıdır.	IM veya IV olarak uygulanır.	25°C oda sıcaklığında saklayınız.
GASTRAZOL FLAKON	Çözelti hazırlandıktan sonra 12 saat içinde kullanılmalıdır.	Sadece IV olarak uygulanır.	25°C oda sıcaklığında saklayınız.
GELOFUSİNE İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ		Çözeltide bulanıklık renk değişikliği varsa ambalajda sızıntı fark edilirse kullanılmaz. Önceden açılmış ve kısmen kullanılmış ilaç atılmalıdır, serum setine bağlanmamalıdır.	25°C altında oda sıcaklığında saklanır.
GENİVİG FLAKON	Tek kullanımlıktır. Her bir flakondan arta kalan çözelti atılmalıdır.	Direkt olarak veya %5 glukoz çözeltisi ile seyreltilerek I V olarak kullanılır.	2-8°C arasında buzdolabında saklayınız. Nemden ve ışıktan koruyunuz. Dondurmayınız.
GENTA 40 MG AMPUL	Ampul tek kullanımlıktır. Çözelti açılınca hemen kullanılmalıdır. Kullanılmayan kısımlar atılmalıdır.	Eenjeksiyonda diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır	30°C altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

# İLAÇLARIN KULLANIM SÜRESİ, DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE SAKLANMA KOŞULLARI LİSTESİ

Kodu  
İY.LS.33

Yayın tarihi  
20.10.2023

Revizyon No  
0

Revizyon tarihi  
-

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
4 / 7

İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
GENTAMİSİN SÜLFAT 20 MG AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.		30 °C'nın altında oda sıcaklığında saklayınız.
GEROFEN SÜSPANSİYON. PEDİFEN SÜSPANSİYON		Kullanmadan önce homojen görünüm elde edinceye kadar çalkalayınız.	25°C altında oda sıcaklığında saklanır.
GLUCAGEN HYPOKİT 1 MG FLAKON	Sulandırıldıktan sonra Glucagen hemen kullanılmalıdır	SC veya IM olarak uygulanmalıdır.	25°C altında oda sıcaklığında saklanır. Dondurmayınız.
GLYCOPHOS KONSANTE ÇÖZELTİ	Açılan flakonlarda arta kalan kısımları atılmalıdır.	Seyreltilmeden verilmemelidir. İnfüzyon süresi 8 saatten kısa olmamalıdır.	25 °C'nın altında oda sıcaklığında saklayınız dondurmayınız.
HEPARİN SODYUM 25000 IU FLAKON	Açıldıktan sonra 24 saat içerisinde kullanılmalıdır.	IV veya SC uygulanır.	25 °C'nın altında oda sıcaklığında saklanır.
HUMALOG KARTUŞ	Kartuş kaleme yerleştirildikten sonra 28gün buzdolabında 2-8°C saklanabilir.	Kaleme yerleştirilen kartuşları iğne takılı olarak saklayınız.	Buzdolabında 2-8°C arasında saklayınız Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız.
HUMAN ALBÜMİN %20 50 ML FLAKON	İnfüzyon şişesi açıldıktan sonra içerik hemen kullanılmalıdır.	IV olarak uygulanır.	25°C altında oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak ambalajıyla saklanmalıdır. Dondurmayınız donmuş ürünü çözüp kullanmayınız.
HYPERHEP FLAKON	Enjektör bir kez açıldığında hemen kullanılmalıdır. Kalan kısımları atılmalıdır.	Bulanık, kalıntı veya partikül içeren çözeltileri kullanılmaz.	2-8°C buzdolabında saklanmalı ürün kesinlikle dondurulmamalıdır. Donmuş ürün çözüldükten sonra kullanılmamalıdır.
İESEF 0,5 GR FLK SEFTRİAKSON 0,5 GR FLAKON	Çözeltiler hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Çözeltilerin rengi saklama süresi konsantrasyon kullanılan çözeltiye bağlı olarak açık sarı ile amber rengi arasında değişir.	30°C altında oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
İMİPENEM 500 GR FLAKON (CİLAPEM 0,5 GR FLAKON)	Hazırlanan solüsyonlar Stabilitesi		
	Seyreltici	Oda ısısı	Buzdolabı
	İzotonik	4saat	24saat
	%5Dextroz	4saat	24saat
	%10Dextroz	4saat	24saat
	%0,45NaCL	4saat	24saat
Mannitol	4saat	24saat	
		Cilapem IV steril toz. Tablodaki gibi hazırlanmalıdır. Berrak bir solüsyon elde edilene kadar çalkanmalıdır. Rengin sarıya doğru çeşitlilik gösterilmesi ilacın potansiyonunu etkilemez.	Kuru toz 25°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
JETOKAİN AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	İşıktan uzak tutulmalıdır Donmaktan korunmalıdır.	Oda sıcaklığında 16-25°C arasında saklanmalıdır. 16°C altında Kristallenme olabilir 25°C üzerinde vazokonstriktör dayanıklılığı önemli ölçüde azatılır.
KEPPRA 100 MG ORAL SÜSP	Açıldıktan sonra 25°C 'de aklanmalıdır.	İşığa hassasiyetten ambalajında muhafaza ediniz.	25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
KETALAR FLAKON	Tek kullanımlıdır. Her operasyon sonrası artan ürün atılmalıdır.	Oral kullanılır.	15-30°C arasında ışıktan koruyarak saklayınız.

## İLAÇLARIN KULLANIM SÜRESİ, DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE SAKLANMA KOŞULLARI LİSTESİ

Kodu  
İ.Y.LS.33

Yayın tarihi  
20.10.2023

Revizyon No  
0

Revizyon tarihi  
-

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
5 / 7

İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
<b>KLARİTROMİSİN FLAKON</b>	Sulandırılmış Klacid® I.V. oda sıcaklığında 24 saat, 5 °C'de 48 saat saklanabilir.	İntavenöz klaritromisin infüzyon karışımına çözeltinin kimyasal veya fiziksel stabilitesi üzerine etkisi saptanmadan hiçbir ilaç veya kimyasal madde ilavesi yapılmamalıdır.	Açılmamış flakonlar 30 °C'nin altında oda sıcaklığında ambalajında saklayınız.
<b>KLORAMİN 25MG 70ML SÜSP.(KLACİD ORAL SÜSPANSİYON KLAMER ORAL SÜSP.)</b>	Hazırlanmış süsp. 25°C altında 14 gün aktivesini korur.	Ambalaj içinde bulunan saf su granül bulunan süsp.şişesine iki defada ilave edilir her su eklendiğinde şişe iyice çalkalanır.	25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
<b>KLOVİREKS FLAKON</b>	Klovireks flakon sulandırıldıktan sonra hemen uygulanacağı parenteral sıvıya katılmalı flakondaki kullanılmış miktar atılmalıdır.	IV yolla uygulanır.	25°C altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
<b>KONAKİON AMPUL (K VİTAMİNİ)</b>	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır	Oral,İM,İV olarak kullanılır.	25oC altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır. Dondurmayınız.
<b>LANTUS SOLOSTAR KARTUŞ</b>	Kullanımdaki kalemler :Kullanılmakta olan kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemleri veya yedek olarak taşınan kartuşlar maksimum 4 hafta süre ile 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında direkt ışıktan ve ısıdan korunmak şartıyla saklanabilir. Kullanımdaki kalem buzdolabında saklanmamalıdır. Bu süreden sonra kullanmayınız.	Her gün aynı saatte alınmalı günde 1 kez.	Kullanılmamış kalemler 2 °C – 8 °C arası sıcaklıklarda buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız Kullanıma hazır dolu kalemleri ışıktan korumak için karton kutusunda saklayınız. .
<b>LOKALEN POMAD</b>			25°C altında oda sıcaklığında saklayınız
<b>LUMİNALETTEN TABLET</b>		Oral kullanılır.	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.
<b>MADECASOL POMAD</b>	Açıldıktan sonra tarih yazarak son kullanma tarihine kadar kullanılır.		25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.
<b>MAGNEZYUM SULFAT %15 AMPUL</b>	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	İ.V. ya da İ.M. yolla uygulanabilir.	30°C altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.
<b>MEROPENEM 0.5 GR FLAKON</b>	Açıldıktan sonra çözölmüş ürün hemen kullanılmalıdır. En fazla 24 saatte buzdolabında 2-8°C saklanmalıdır.	Açılmış solüsyonun tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	30 °C oda sıcaklığında saklayınız.
<b>MİKOSTATİN ORAL SÜSPANSİYON NİSTATİN 10000 IV</b>		Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.	15-30°C arasında oda sıcaklığında saklanır.
<b>MOTİLİUM 1 MG 200 ML SÜSPANSİYON (DOMPERİDON 1MG)</b>	Şişe bir kez açıldıktan sonra 3 aydan fazla kullanılmamalıdır.		15-30 °C arasında oda sıcaklığında saklanır.
<b>MUCONEX ŞURUP (ASETİLSİSTEİN 200MG )</b>	Açıldıktan sonra 12 gündür.	Şişedeki işaretli yere kadar su doldurulur ve şişe iyice çalkalanır içerik tamamen çözölmelidir.	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.

## İLAÇLARIN KULLANIM SÜRESİ, DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE SAKLANMA KOŞULLARI LİSTESİ

Kodu  
İY.LS.33

Yayın tarihi  
20.10.2023

Revizyon No  
0

Revizyon tarihi  
-

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
6 / 7

İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
MYDFRİN GÖZ DAMLASI	Açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.		25°C altında oda sıcaklığında saklayınız
NEOSTİGMİNE AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.		25°C altında oda sıcaklığında saklayınız
NOVOPYRINE AMPUL (METAMİZOL AMPUL)	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır		25 °C'nın altında oda sıcaklığında saklayınız.
PARASETAMOL FLAKON PAROL FLAKON	Açılmış veya seyreltilmiş çözeltileri kullanılabilirlik süresi infüzyon süresi dahil 1 saatten fazla değildir.	Dondurmayınız Buzdolabında saklamayınız.	25 °C'nın altında oda sıcaklığında ambalajında saklayınız.
PENBİSİN 0,5 GR FLK AMPİSİLİN 0,5 GR FLK	Sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.		25 °C'nın altında oda sıcaklığında saklayınız.
PENİSİLİN İMİLYON FLAKON	Açıldıktan sonra hazırlanmış solüsyonlar önemli aktivite kaybı olmadan 7 gün buzdolabında tutulabilir	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	30 °C'nın altında saklanır. Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır.
PENTAL SODYUM 0,5GRFLK.	Her bir flakon sadece bir anestezi için ve bir kullanım içindir.	Sadece berrak çözeltileri kullanılmalıdır. Tam olarak çözülmemiş pental sodyum çözeltiler veya bulanık çözeltiler anestezi için kullanılmamalıdır.	25 °C'nın altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
POLİVİT SÜSPANSİYON		Aç veya tok alınabilir.	25°C altında oda sıcaklığında saklayınız
POTASYUM KLORÜR AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.		25 °C'nın altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
PREDNOL 20 MG AMPUL	Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.	Özellikle çocuklarda uygulanan etkili en düşük doz ile en kısa sürede yapılmalıdır.	Çocukların ulaşamayacağı yerlerde oda sıcaklığında ambalajında saklayınız.
PRİMPERAN AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.		30°C oda sıcaklığında saklayınız.
PROPOFOL AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.		15-30°C altında saklayınız. Dondurmayınız.
PULMİCORT NEBULİZOR BUDECORT	Açılan ampuller 12 saat içinde kullanılmalıdır.		Dik konumda ve ışıktan koruyarak muhafaza edilmelidir. Alüminyum folyo zarfları açıldıktan sonra tek dozluk ampüllerin kullanılmayan kısımları ışıktan korunması için zarflarda muhafaza edilmelidir.
RANİTİDİN (RANİVER) AMPUL	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Raniver %0,9 NaCL %5 Dextroz intravenöz infüzyon sıvıları ile geçimlidir.	Açılmayan ilaç 30°C altında oda sıcaklığında ışıktan korunarak saklanmalıdır.
REFLOR ŞAŞE		Nemden ve güneş ışığından koruyunuz.	25°C altında
SANDOSTATİN AMPUL	Açıldıktan sonra kullanım esnasında 2 hafta 30oC altındaki oda sıcaklığında kalabilir.		Işıktan koruyarak buzdolabında 2-8°C arasında saklayınız. Dondurmayınız.

## İLAÇLARIN KULLANIM SÜRESİ, DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE SAKLANMA KOŞULLARI LİSTESİ

Kodu  
İY.LS.33

Yayın tarihi  
20.10.2023

Revizyon No  
0

Revizyon tarihi  
-

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
7 / 7

İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
<b>SEFTAZİDİM 0,5 GR FLAKON (İSETUM 0,5GR FLAKON)</b>	Seftazidim çözeltisi su ile çözüldüğünde hemen kullanılmayacaksa buzdolabında 24 saat süreyle saklanabilir. Ancak sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılması tercih edilmelidir	İsetum yaygın olarak kullanılan IV sıvıların çoğu ile geçimlidir. Ancak NaHCO <sub>3</sub> enjeksiyon seyreltici olarak tavsiye edilmemektedir ürün sulandığında CO <sub>2</sub> açığa çıkar ve pozitif basınç oluşur sulandırılan solüsyon içinde CO <sub>2</sub> kabarcıkları göz ardı edilebilir.	25°C altında oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
<b>SETRON AMPUL</b>	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Dondurmayınız.	25°C altında ışıktan koruyarak saklayınız.
<b>SULCİD 0,5 GR FLAKON</b>	Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.		30°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
<b>SULZON 1GR FLAKON</b>	Sulandırıldıktan veya seyreltikten sonra 24 saat içinde kullanılmamalıdır.	Sulandırma için steril enjek. su ile kullanılmalıdır. Laktatlı Ringer solüsyonu ile geçimsizdir.	Açılmayan ilaç 25°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
<b>SURVANTA İNTRATRAKEAL FLAKON</b>		İntratrekeal kullanılır. Açıldıktan sonra arta kalan ilaç atılmalıdır.	Açılmayan ilaç buzdolabında 2-8 °C ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
<b>TALCİD SÜSPANSİYON</b>		Emilim değişikliğini önlemek üzere genelde diğer ilaçlardan 1-2 saat önce veya sonra alınmalıdır.	25°C altında oda sıcaklığında saklanır.
<b>TAZOPER 2,25 GR FLAKON</b>	Kullanıma hazır çözelti buzdolabında (2-8o C) 48 saat oda sıcaklığında 24 saat dayanıklı kalırlar.		Açılmayan flakonlar 25°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır
<b>TAZOPER 2,25 GR FLAKON</b>	Kullanıma hazır çözelti buzdolabında (2-8o C) 48 saat oda sıcaklığında 24 saat dayanıklı kalırlar.		Açılmayan flakonlar 25°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
<b>TEKOSİT 200MG FLK TEİKOPLANİN 200MG FLK</b>	Sulandırıldıktan sonra 2-8oC buzdolabında saklanmalıdır. 24 saatten uzun süre bekletilen solüsyonlar kullanılmamalı		25°C altında oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak ambalajında saklayınız.
<b>TRİMOKS PEDIATRİK SÜSP.</b>		ışıktan koruyunuz.	25°C altında oda sıcaklığında
<b>URSOFALK SÜSP.</b>	Açıldıktan sonra 4 ay saklanır.		25°C altında oda sıcaklığında saklayınız
<b>VANCOMYCİN 0,5GR FLAKON</b>	Mikrobiyolojik yönden hemen kullanılmalıdır. Hazırlanan solüsyon kontrol altında 2-8oC 24saatten fazla saklanmaz.	Yavaş infüzyon yapılır.	25°C altında oda sıcaklığında saklanır.
<b>ZİNCO ŞURUP</b>	Tetrasiklinlerle birlikte kullanılmamalıdır.	Demir preparatları çinko sulfatın emilimini azaltır.	25°C altında oda sıcaklığında saklanır.