
 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	ACİL KULLANILABİLECEK PEDIATRİK İLAÇLARIN KİLOGRAMA GÖRE DOZLARI LİSTESİ	 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ		
Kodu İY.LS.59	Yayın tarihi 20.10.2023	Revizyon No 0	Revizyon tarihi -	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1 / 1

İLAÇLAR	DOZLARI
ADRENALİN	0,01MG/KG. 1 ML LİK AMPULDE 0.5 MG 1 ML Sİ 5 CC DİSTİLE SU İLE SULANDIRILIP KG YA 1 – 2 DİZYEM YAPILIR
ATROPİN	0,01MG/KG. 1 ML LİK AMPULDE 0.5 MG 1 ML Sİ 5 CC DİSTİLE SU İLE SULANDIRILIP KG YA 1 – 2 DİZYEM YAPILIR
DİAZEPAM	0,1-0,5MG/KG. AMPUL KİLOYA 1 DİZYEM İV PUŞE SULANDIRILMAZ
EPANUTİN	5 MG/KG , 5 ML LİK AMPULDE 250 MG 1 DİZYEMİ 5 MG SULANDIRILMAZ
DOPAMİN	0,002-0,005MG/KG/DK. İNFÜZYON ŞEKLİNDE 4 SAATLİK DOZLARDA VERİLİR
DORMİCUM	0,1-0,2MG/KG/SAAT. İNFÜZYON ŞEKLİNDE VERİLİR. DOPAMİN UYGULAMASI İLE KARIŞTIRILMAMALIDIR
POTASYUM KLORÜR	1 CC/KG. ÇOK DÜŞÜK DOZLARDA TOTAL MAYİYE KATILIR. PUŞE OLARAK VERİLMEZ
CALCIUM GLUKONAT	1CC/KG 1/1 ORANINDA DİSTİLE SU İLE SULANDIRILIR. EN AZ 3 DK DA PUŞE OLARAK VERİLMELİDİR. BEBEK MONİTÖRİZE EDİLİR.VEYA HAZNEYE KONUR
SODYUM BİKARBONAT	1CC/KG. 1/1 ORANINDA DİSTİLE SU İLE SULANDIRILIR. EN AZ 3 DK DA PUŞE OLARAK VERİLMELİDİR. BEBEK MONİTÖRİZE EDİLİR. VEYA HAZNEYE KONUR
MAGNEZYUM SÜLFAT	0,1-0,4 MG/KG. TOTAL MAYİYE KATILARAK 4 – 6 – 8 SAAT ŞEKLİNDE VERİLİR. EN AZ 3 DK DA PUŞE OLARAK VERİLMELİDİR. BEBEK MONİTÖRİZE EDİLİR.VEYA İM. YAPILIR
AMİNOCARDOL (CARENA) AMP	2MG/KG. PUŞE OLARAK VERİLEBİLİR. YÜKLEME DOZU VARDIR. KİLOYA 1 DİZYEM OLARAK VERİLİR. (1DİZYEM 2.4 MGR)
LASİX	1MG/KG.AMPUL 2 CC DİR. PUŞE OLARAK DÜŞÜK DOZLARDA VERİLİR. 1 DİZYEM 2 MGR)
MANNİTOL %20'LİK	1GR/KG. (10 CC 2GR)
PİRİDOKSİN	50MG. (1 DİZYEM 15MGR (2 CC 300 MGR)
DEKORT	1MG/KG (1 MRG 2.5 DİZYEM (2CC 8MGR)
PREDNOL	2MG/KG. (2 CC İZOTONİK 20 MGR 1DİZYEM 1 MGR)
PEN G KRİSTALİZE	100000 Ü/ KG
SEFTRİAKSON	100 MG./ KG.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan